


■ *Liolaemus chiliensis* (Lesson, 1830)

Nombre común: Lagarto llorón. Lagarto chillón. *Weeping lizard*.



Etimología: Referida a Chile (Chili en francés), país en que fue descubierta.

Reconocimiento: El tamaño es grande y de aspecto fornido, la cola generalmente duplica el largo del cuerpo. Cabeza triangular y cuello sin pliegues. Extremidades cortas y macizas. Las escamas dorsales son lanceoladas, imbricadas y con prominente quilla terminada en mucrón, que le otorgan un aspecto fuertemente erizado. Escamas ventrales subtriangulares, lisas e imbricadas. Solo el macho generalmente posee dos poros precloacales, aunque puede presentar hasta cuatro. Coloración del dorso verdosa variando a amarillenta, con dos bandas supraoculares más claras que atraviesan toda la espalda y la cola. A ambos lados de estas bandas existen manchas oscuras irregulares, que pueden formar patrones longitudinales o transversales. El vientre es blanquecino, a veces con tonalidades amarillentas y destellos tornasolados. Exhibe dicromatismo sexual, en donde el macho muestra un tono general más café y la hembra destaca con su coloración verde olivácea. Las poblaciones del Sur, en general, poseen tonalidades más verdes, mientras que las poblaciones del Norte poseen tonalidades más amarillentas o cafésosas.

Distribución: Se encuentra desde el sur de Coquimbo hasta Valdivia, desde la costa hasta 2.100 msnm. Hay registros en Reserva Nacional Lago Peñuelas, Reserva Nacional Radal Siete Tazas, Reserva Nacional Los Bellotos del Melado, Reserva Nacional Los Queules, Reserva Nacional Ñuble, Reserva Nacional Los Huemules del Niblinto, Parque Nacional Nahuelbuta, Reserva Nacional Malleco, Parque Nacional Conguillío, Parque Nacional Puyehue. También está presente en Argentina, en zonas fronterizas con Chile.

Historia natural: Frecuenta matorrales y pastizales en la zona norte, mientras que en la zona sur es común encontrar individuos que ingresan a bosques de *Nothofagus*. También, habita matorral de zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y troncos cortados de árboles plantados como eucaliptus y pinos. Es un excelente trepador que se escapa rápidamente ante la presencia humana. Al ser capturado emite un sonido agudo entrecortado, carácter aludido en el nombre común, y que tendería a ser más leve en las poblaciones del Sur. Su reproducción es ovípara, la hembra entierra entre 10 y 14 huevos. Depreda principalmente invertebrados como escarabajos, arañas y larvas de polillas. Además, han sido encontrados en el estómago restos de individuos juveniles de la misma especie, lo que indica canibalismo.

