

d. *Alstroemeria magnifica* Herb. var. *tofoensis* Muñoz-Schick

» Muñoz-Schick, M. (2003), Notic. Mens. Mus. Nac. Hist. Nat. 352: 22. 2003. TIPO: Chile, Región de Coquimbo, Provincia de Elqui, cerros de El Tofo, bajada a Chungungo (29°26'S – 71°14'W). 667 m, 29 oct 2002, M. Muñoz-Schick 4257 (Holotipo: SGO 150221).

Descripción: Se distingue de las otras variedades del complejo porque tiene hojas angostas, por sus flores cuyos tépalos internos superiores poseen rayitas dispersas, que se reúnen formando una mancha oscura en la base pero que no forman una gran mancha purpúrea en el ápice. Es el taxón del complejo *A. magnifica* que llega más al norte.

Fenología: Florece y fructifica en octubre (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Distribución restringida a la costa de la Región de Coquimbo, desde Punta Barrancones (29°24'S) hasta al sur de Chungungo (29°32'S). Crece en roqueríos costeros y cerros con neblina, entre los 24 y 667 m s.n.m.

Estado de conservación: Taxón vulnerable (VU A2cd), no se encuentra en áreas protegidas ni en sitios prioritarios (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003, Ministerio del Medio Ambiente 2018).

